

必ずお読みください。

インフルエンザ予防接種を受けられる前に

インフルエンザ予防接種を実施するにあたり、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、以下のワクチンに関する情報を必ずお読みいただいた上で、表面の予診票にはできるだけ詳しくご記入下さい。ご高齢の方など自身での記入が難しい方が接種を希望する場合は、健康状態をよく把握しているご家族の方など代理人がご記入ください。なお、対象者の接種希望の意思確認ができない場合は、任意接種・全額自己負担となります。

【インフルエンザ予防接種ワクチンについて】

インフルエンザ予防接種ワクチンは、感染や発症そのものを完全には防御できませんが、重症化や合併症の発生を予防する効果は証明されており、高齢者に対してワクチンを接種すると、接種しなかった場合に比べて、発病予防効果が34～55%、死亡を防止する効果が8割程度期待できます。重大な副反応としてごくまれに、アナフィラキシー症状(じんましん、呼吸困難、血管浮腫等)があらわれることがあり、そのほとんどは接種後30分以内に生じますが、まれに接種後4時間以内に起こることもあります。その他、ギランバレー症候群、けいれん、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、肝機能障害、黄疸、喘息発作があらわれる等の報告があります。また、過敏症として接種直後から数日中に、発疹、じんましん、紅斑、かゆみ等があらわれることがあります。全身症状として発熱、悪寒、頭痛、倦怠感等や局所症状として発赤、腫脹、疼痛等を認めることがあります。通常、2～3日中に消失します。

【予防接種への同意について】

予防接種法に基づくインフルエンザ予防接種は接種を受ける法律上の義務はないことから、接種希望者の自らの意志と責任で接種を希望する場合にのみ接種できます。対象者の意思確認が出来ない場合は、任意の予防接種として(全額自己負担)受けることをご検討ください。

【接種料金】

[I] 対象者:氷川町に住民票がある方で、

- ①65歳以上の人(接種日に65歳以上であること)
- ②60～64歳の人で心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(医師の指示があるかたのみ、身体障害者手帳1級相当の方)

[II] 自己負担:1,350円(消費税込)(氷川町・八代市・宇城市の指定医療機関のみ)

注意) 外来が4,710円、入院・入所が3,479円を超える場合は、自己負担が1,350円を超える場合があります。詳しくは、医療機関へお尋ねください。

【接種不適当者(予防接種を受けることが適当でない方)】

次のいずれかに該当すると認められる場合には、予防接種は受けられません。

- ① 接種当日、明らかな発熱を呈している方。
明らかな発熱とは、通常37.5℃以上をいいます。検温は、接種を行う医療機関(施設)で行います。
- ② 重篤な急性疾患にかかっている方。
「重篤かつ急性」の疾患に罹患している場合には、病気の進展状況が不明であり、このような状態において予防接種を行うことはできません。
- ③ 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある方。
インフルエンザワクチンにより、アナフィラキシーショックを呈した場合には、接種できません。
- ④ インフルエンザの予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う病状を呈したことがある方。
- ⑤ その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方。

【接種要注意者(接種の判断を行うに際し、注意を要する方)】

健康状態及び体質を勘案し、次のいずれかに該当すると認められる場合には、予防接種の効果と副反応について十分に説明を受け、接種することに同意した上で予防接種を受けて下さい。

- ① 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方。
- ② 過去にけいれんの既往のある方。
- ③ 過去に免疫不全の診断がされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方。
- ④ 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する方。
- ⑤ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方。

【ワクチン接種後の一般的注意】

- ①インフルエンザワクチン接種後24時間は副反応(健康状態の変化)の出現に注意し、観察しておく必要があります。特に、接種直後の30分以内は健康状態の変化に注意する必要がありますので、接種した医療機関で様子を見るようにしましょう。
- ②予防接種当日の入浴は差し支えありません。また、接種部位は清潔に保ってください。普段通りの生活で構いませんが、激しい運動は避けて下さい。
- ③予防接種を受けた部位が赤くなったり、腫れたり、痛んだり、軽い発熱が起きることがあります。もし、局所の異常反応や体調の変化、さらには高熱、けいれん等の異常な症状が生じた場合には速やかに医師の診察を受けて下さい。